

## **Pre-Operatorio**

- 1. AYUNO: 8 hs no tomar líquidos ni sólidos
- **2. NO SUSPENDER:** Medicación cardiológica o para la presión. Tomarla en ayunas con poco agua clara (no jugos, solo 2 cucharadas de agua)
- **3. HIGIENE**: Bañarse la noche anterior con jabón desinfectante (Ej. pervinox) no maquillaje, no aros, no piercing, ni uñas pintadas.
- **4. ANTITETÁNICA**: Aplicar vacuna 10 días antes o suero y vacuna el día de la operación. (Si es que no se aplicó en los últimos 10 años)
- **5. MARCAR CON UNA CRUZ EL MIEMBRO A OPERAR** (esto hace que todo el personal quirúrgico sepa cómo colocar los equipos en el momento previo de la cirugía)

## 6. PRESENTARSE 2 HS ANTES CON:

- Análisis de laboratorio
- Electrocardiograma
- Radiografías, Resonancia y/o Otros estudios que tenga
- Orden de cirugía autorizada por la O. Social
- Carnet de O. Social
- Documento
- Cabestrillo o inmobilizador de rodilla o sandalia para Hallux
- 7. Avisar en caso de Alergias medicamentosas.
- 8. Firmar el consentimiento médico (ingresarlo al quirófano).

## **Post Operatorio PIE**

- **1. REPOSO:** permanecer en reposo semi acostado x 48 hs, pie en alto, arriba de la panza. no sacarse valva o venda elástica.
- 2. EJERCICIOS (3 veces por dia 10")
- Movilidad de dedos del pie y Tobillo, solo y con ayuda. juanete apoyo inmediato con sandalia para Hallux.
- 3. HIGIENE: no mojar el vendaje
- cubrir con nylon para bañarse o papel Im.
- si mancha el vendaje curar con alcohol y cubrir con gasas y vendas
- **4. MEDICACIÓN:** Diclofenac 75 mg + cefalexina 1 g ambos cada 12 hs durante 4 dias, mayor dolor Tramadol 10 gotas ( hasta 3 veces al dia)
- 5. COMUNICARSE: Si tiene fiebre o dolor que no mejore con los calmantes